

INSTITUTO HÓRUS DE DESENVOLVIMENTO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				
RESULTADO				Recomendação
	Pontuação: 11	Avaliação válida (>70% das perguntas respondidas), RISCO MODERADO		Avaliação posterior
	Análise de risco para plantas invasoras			Coffea arabica
Seção	Grupo		Questão	Café
Histórico biogeográfico				
A	Cultivo / Domesticção	1.01	O táxon apresenta fortes indícios de domesticação?	sim
		1.02	Há registros de que o táxon esteja se propagando espontaneamente nos locais onde está domesticado?	sim
		1.03	Táxons da espécie estão registrados como plantas daninhas ou pragas?	sim
	Clima	2.01	O táxon ocorre naturalmente ou há registro de que esteja estabelecido em alguma região de clima Equatorial?	sim
		2.02	O táxon ocorre naturalmente ou há registro de que esteja estabelecido em alguma região de clima Tropical (Zona Equatorial, Nordeste Oriental ou Brasil Central)?	sim
		2.03	O táxon ocorre naturalmente ou há registro de que esteja estabelecido em alguma região de clima Temperado ou Subtropical?	sim
	Registros de ocorrência e invasão	3.01	O táxon apresenta histórico de introduções repetidas fora da sua área de distribuição natural?	sim
		3.02	Há registro de que o táxon esteja estabelecido fora da sua área de ocorrência natural historicamente conhecida?	sim
		3.03	Há registro de impactos causados pelo táxon em jardins, benfeitorias ou áreas degradadas?	sim
		3.04	Há registro de impactos causados pelo táxon em áreas com atividade agrícola, pecuária, silvicultural ou horticultural?	não
		3.05	Há registro de que a espécie seja invasora de ambientes naturais em algum lugar do mundo?	sim
		3.06	Outras espécies do mesmo gênero são consideradas invasoras em outras regiões ou estão estabelecidas no Brasil?	não
Características indesejadas				
B	Atributos indesejados	4.01	O táxon apresenta espinhos, acúleos ou outra saliência capaz de causar ferimentos ou impedir a passagem de pessoas ou animais?	não
		4.02	Há evidências de que o táxon produza alterações químicas no solo? (tais como alelopatia, mudança de pH, fixação de nitrogênio, entre outros)	sim
		4.03	É um táxon parasita?	não
		4.04	É um táxon impalatável para animais de pasto nativos ou introduzidos?	
		4.05	É um táxon tóxico para seres humanos ou para animais nativos ou domesticados economicamente importantes?	não
		4.06	Há registro de que o táxon seja hospedeiro ou vetor de pragas ou patógenos conhecidos que afetem espécies nativas ou de valor?	sim
		4.07	O táxon causa alergias em seres humanos?	não
	Hábito e potencial competição por recursos em ambientes naturais	5.01	Há evidências de que o táxon produza alterações físicas em interações ecológicas? (tais como aumento do risco de ocorrência de incêndios, altera processos erosivos naturais, afeta o sistema hidrológico do solo)	não
		5.02	É um táxon tolerante à sombra em alguma fase do ciclo de vida?	sim
		5.03	O táxon tolera solos arenosos, ácidos ou de baixa fertilidade?	sim
		5.04	O táxon é uma liana ou tem outra forma de crescimento capaz de suprimir outras plantas?	não
		5.05	O táxon forma touceiras densas? (principalmente lenhosas perenes)	sim
		5.06	O táxon é uma árvore, arbusto lenhoso perene, erva, grama ou geófito? (caso o táxon não pertença a nenhum destes grupos, o campo resposta deve permanecer em branco) responder: "árvore" ou "arbusto" ou "erva" ou "grama" ou "geófito" ou "não"	arbusto
		Características biológicas e ecológicas		
C	Mecanismos reprodutivos	6.01	Há evidências da presença de fatores bióticos na área de distribuição natural da espécie que reduz sua capacidade reprodutiva?	sim
		6.02	O táxon produz sementes viáveis?	sim
		6.03	Há evidências de que o táxon seja capaz de realizar hibridização interespecífica?	sim
		6.04	Há no país alguma espécie endêmica congênere?	não
		6.05	O táxon é capaz de realizar autopolinização ou apomixia?	sim
		6.06	O táxon necessita de polinizadores especializados?	não
		6.07	O táxon se reproduz por fragmentos vegetativos diferentes dos apomíticos ou geofíticos?	não
		6.08	Qual a duração do período juvenil? [a] até 1 ano; [b] 1-4 anos; [c] mais de 4 anos	b
	Mecanismos de dispersão de propágulos	7.01	Produz propágulos com probabilidade de dispersão involuntária por pessoas, máquinas etc.?	não
		7.02	Produz propágulos dispersados intencionalmente ou cultivados por pessoas?	sim
		7.03	Produz propágulos com probabilidade de dispersão como contaminantes de produtos?	não
		7.04	Produz propágulos adaptados para dispersão pelo vento (anemocoria)?	não
		7.05	Produz propágulos adaptados para dispersão por água (hidrocoria)?	não
		7.06	Produz propágulos dispersados por pássaros (ornitocoria) ou morcegos (quiropterocoria)?	sim
		7.07	Produz propágulos dispersados por animais (externamente)?	não
7.08		Produz propágulos dispersados por animais que se alimentam dos frutos e as sementes sobrevivem à passagem pelo sistema digestório?	sim	
	8.01	O táxon é um produtor de sementes prolífero?	não	

	Atributos de persistência	8.02	Há evidências de que as sementes do táxon permanecem viáveis no solo por mais de 1 ano?	
		8.03	É possível e fácil encontrar uma forma de controle eficaz com custos razoáveis?	sim
		8.04	Algum predador natural efetivo do táxon está presente no país?	sim
		Documentação		
		1.01		
		1.02	I3N Brasil - Em ocorrência em SP, município de Cananéia, havia cultivo de cafezeiros e são fontes de dispersão de sementes que estão gerando um lento processo de invasão biológica do sub-bosque de Floresta Atlântica.	
		1.03		
		2.01		
		2.02		
		2.03		
		3.01		
		3.02		
		3.03		
		3.04		
		3.05		
		3.06		
		4.01		
		4.02	As sementes possuem propriedades alelopáticas liberadas durante a germinação (Suzuki & Walle, 1987).	
		4.03		
		4.04		
		4.05		
		4.06	http://www.revistacafeicultura.com.br/index.php?tipo=ler&mat=6819; Randig et al., 2004, Identificação das principais espécies de Meloidogyne parasitas do cafeeiro no Brasil com marcadores SCAR-Café em Multiplex - PCR.; http://agrobyte.com.br/cafe.htm	
		4.07		
		5.01		
		5.02	É tolerante à sombra (http://www.hear.org/pier/species/coffee_arabica.htm).	
		5.03	Tolera solos ácidos (http://www.hear.org/pier/species/coffee_arabica.htm)	
		5.04		
		5.05	Pode formar densas touceiras (http://www.hear.org/pier/species/coffee_arabica.htm)	
		5.06		
		6.01	http://agrobyte.com.br/cafe.htm	
		6.02		
		6.03	Pode formar híbridos com outras espécies de Coffea (http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-	
		6.04		
		6.05	A planta faz autopolinização - http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0006-87051949000100002&script=sci_arttext	
		6.06		
		6.07	I3N Brasil - A planta reproduz por sementes	
		6.08	A planta começa a produzir sementes entre 3-5 anos - http://coffee-info.org/types.html	
		7.01		
		7.02		
		7.03		
		7.04		
		7.05		
		7.06		
		7.07		
		7.08		
		8.01		
		8.02		
		8.03		
		8.04		